

# T a u c h u n f a l l ?

← Taucher – Notarzt ->  
Maßnahmen

Ruhe bewahren !

Taucher retten und Ausrüstung abnehmen

Lebensrettende Sofortmaßnahmen (ABC)

Lagerung: stabile Seitenlagerung  
(bei bewußtlosen)  
flache Rückenlagerung  
(bei Ansprechbaren)

Lagerung: stabile Seitenlagerung  
(bei bewußtlosen)  
flache Rückenlagerung  
(bei Ansprechbaren)

Sauerstoffabgabe (100 %) über Maske

Normobare Sauerstoffabgabe (100 %) über  
Maske

Rettungsdienste alarmieren

Differentialdiagnose ggf. mit Therapie-  
zentrum (Taucher - Notruf) und Taucher-  
mannschaft

Ständige Kontrolle der Vitalfunktionen  
(Atmung, Puls, Ausfälle ?)

Bei schwerem Tauchunfall:  
i.v. 1000 ml Elektrolytlösung/h über die  
ersten 2 Stunden oder  
500 ml Haes mittelmol./h;  
Dexamethason bis zu 100 mg einmalig;  
ASS bis zu 1000 mg oral o.  
i.v.; Diazepam; Analgetika;

Dokumentation; Tauchgerätschaften  
sicherstellen

Einweisung des Rettungsdienstes

Transport des Tauchers auf Weisung  
des Notarztes vorbereiten/begleiten

Transport des Tauchers in Klinik oder  
Therapiezentrum veranlassen/begleiten

Copyright 2002 by  
Tauchen in Tirol – D.Kuchling  
E. Bodem Gasse 3 – A- 6020 Innsbruck  
Tel.: ++43(0)512 / 39 34 84

(Notarztmassnahmen nach Dr. U. van Laak)